

I clinici possono partecipare alla ricerca per validare il modello Analitico Transazionale per la cura dei disturbi ansiosi scegliendo tra diversi livelli di complessità di protocollo.

L'ideale ovviamente è partecipare al livello maggiore.

Qualora il contesto non lo permettesse, è accettabile un livello più semplice.

SCED

		<i>assessment</i>			<i>trattamento</i>																<i>Follow up</i>			
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<i>F1</i>	<i>F2</i>	<i>F3</i>	
Livello 1	GAD7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 1	HAM-A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 2	CORE-OM	x	x	x								x								x	x	x	x	x
	PHQ9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 3	PQ	X*	X*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Follow up: 1, 3, 6 mesi; potendo, richiami anche a 12, 24, 36 mesi.

* Il PQ si prepara nelle sedute A e B di assessment e si compila per la prima volta nella seduta C

HSCED

		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<i>F1</i>	<i>F2</i>	<i>F3</i>	
Livello 1	Registrazione seduta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 1	GAD7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 1	CORE-OM	x	x	x							x								x	x	x	x	x
Livello 1	PQ	X*	X*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 1	HAT				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Livello 1	Aderenz T				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Livello 1	Aderenz S						x				x				x				x				
Livello 1	Change Interview																			x			
Livello 2	PHQ9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Livello 2	HAM-A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Follow up: 1, 3, 6 mesi; potendo, richiami anche a 12, 24, 36 mesi.

* Il PQ si prepara nelle sedute A e B di assessment e si compila per la prima volta nella seduta C